

Znieczulenie miejscowe.

Autor: Katarzyna (Warszawa)

14.04.2007.

Zmieniony 23.07.2008.

Wybierając się do dentysty, nieraz pacjent czuje lęk czy obawę. Być może boi się właśnie bólu. Jednak nie zawsze musi cierpieć. Dentysta na pewno zapyta przed jakimkolwiek zabiegiem, który może powodować ból, czy chciałby znieczulenie.

Są jednak sytuacje, w których znieczulenie miejscowe może działać zbyt słabo. Dzieje się tak zwykle wtedy, gdy pacjent ma stan zapalny, ukryty bądź ostry lub zażywał niektóre leki, np. nospa.

Jeżeli pacjent zażywał narkotyki lub pił alkohol w trakcie ostatnich 48 godzin, to znieczulenie także może słabiej zadziałać. Pacjenci różnią się wrażliwością na środki znieczulające. Niektórzy mogą być na nie bardzo wrażliwi, inni zaś tak mało podatni, że dawka, która powinna wystarczyć dla nich jest za mała.

Znieczulenie może również dobrze nie zadziałać wtedy, kiedy zostanie źle podane, tzn. nieprecyzyjnie, i nie obejmie leczonego obrębu. Jeżeli pacjent boi się igły, stomatolog ma utrudnione zadanie. Niektórzy właśnie z tego powodu nie chcą znieczulenia... WIĘCEJ NA: <http://www.znieczulenie.pl/znieczulenie-miejscowe-u-dentysty/#more-3>